



徐慶玲牙周病植牙專科

Dr. Hsu's Periodontal Clinic

www.periohsu.com

periohsu@gmail.com

牙周病的手術治療

在牙周病的非手術治療中，一些較深的囊袋或在牙根型態較特殊的地方，例如，後牙的牙根分叉處或牙根凹陷處，可能因牙肉的阻擋，而無法做完全的牙結石移除。經研究顯示，在中度的囊袋，即 4~7mm 的囊袋，牙周病非手術治療大約會進步 2~3mm，也就是說，中度的囊袋在非手術治療後，大部分都有機會將囊袋降至 5mm 以下。更深的囊袋，雖然統計顯示，進步的程度可能大於中度囊袋，但也會因深度太深，非手術治療的進行會有其限制。所以恢復的狀況就比較難預測了。

大部分的牙周手術進行前，宜先進行非手術治療。當非手術治療無法完全解決問題時，再考慮手術的方式。甚至在手術治療前，也可應用藥物治療，將問題更進一步解決後，再視需要進行手術。

牙周病手術治療的優點在於：

1. 能直接清楚的看到牙根表面的疾病情形
2. 能更正確的判斷患病牙齒的預後
3. 能有效率的減除囊袋
4. 為失去的牙周組織進行再生
5. 使注後的牙齒復形更為容易 (牙冠增長術)
6. 使口腔衛生的維持更為容易

牙周手術前的幾項準備工作一定要做好：

1. 在非手術治療後需給組織夠長的恢復期
2. 低於 20% 的牙菌斑顯示
3. 全身性疾病及藥物的配合(如糖尿病的控制，煙量的減少，心內膜炎預防性用藥，抗凝血藥物...的配合停藥等等...)

最後，徐醫師的再度叮嚀：若配合確實的口腔衛生習慣，可減少許多不必要的牙周手術治療！常發現盡心作到口腔衛生要求的病人，往往需要進行進階牙周手術的機率，就大為降低了！